

PASS/LAS

Mercredi 26 mai 2021

Module 5	EPREUVE Maïeutique	Durée 1h00
----------	-----------------------	---------------

CONSIGNES A LIRE AVANT L'EPREUVE

Vérifiez que votre sujet est complet

L'épreuve comporte :

- 1 cahier questions (5 pages)
- 0 feuille de brouillon

IMPORTANT :

Remplissage de la feuille réponses :
lire consignes et exemple de marquage sur la feuille réponses QCM

QCS : une seule réponse exacte
QCM : plusieurs réponses exactes

Conformément aux dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992, tout étudiant auteur ou complice d'une fraude ou d'une tentative de fraude à l'occasion d'un examen ou concours relève du régime disciplinaire prévu par ledit décret. A ce titre, tout fautif est susceptible d'être traduit devant la Section Disciplinaire du Conseil d'Administration de l'Université, et de se voir appliquer une sanction (avertissement, blâme ou exclusion).

Embryologie

- 1) QCM. Les éléments suivants sont constitutifs de la plaque chorale
 - a) cytotrophoblaste
 - b) amnios
 - c) syncytiotrophoblaste
 - d) caduque basilaire
 - e) mésoderme extra-embryonnaire

- 2) QCS. à propos des veines ombilicales
 - a) dans les capillaires veineux villositaires, la pression est deux fois plus faible que dans les capillaires artériels villositaires
 - b) elles drainent la vésicule ombilicale
 - c) elles sont connectées à la plaque basale du placenta
 - d) initialement au nombre de deux, seule la veine ombilicale droite persistera
 - e) elles déversent leur contenu dans la chambre intervillieuse

- 3) QCS. Le glucose traverse la membrane placentaire
 - a) par diffusion simple
 - b) par transport facilité
 - c) par transport actif
 - d) par diffusion passive
 - e) par endocytose

- 4) QCM. Le cordon ombilical définitif est constitué
 - a) de l'amnios
 - b) de l'allantoïde
 - c) de la gelée de Wharton
 - d) de la veine ombilicale droite
 - e) de l'artère ombilicale gauche

- 5) QCM. Une grossesse débute après implantation d'un seul blastocyste qui présente deux masses cellulaires internes
 - a) il s'agit d'une grossesse monozygote
 - b) il s'agit d'une grossesse bichoriale
 - c) il s'agit d'une grossesse bi-amniotique
 - d) la membrane inter-amniotique sera fine
 - e) ce type de grossesse représente environ 0,3% des naissances

- 6) QCM. à propos des canaux de Wolff
 - a) ils apparaissent après les canaux de Müller
 - b) ils apparaissent à partir de la cinquième semaine de développement
 - c) ils sont aussi appelés canaux mésonéphrotiques
 - d) leur canalisation est simultanée à leur croissance caudale
 - e) ils entrent en contact avec la partie postérieure du cloaque

- 7) QCM. Chez un embryon de sexe masculin, chaque canal de Wolff va se différencier en
- vésicule séminale
 - canal déférent
 - canal efférent
 - canal épидидymaire
 - prostate
- 8) QCS. Lequel de ces gènes est impliqué directement dans la différenciation féminine de la gonade ?
- Wnt4*
 - Dax1*
 - Sry*
 - Insl3*
 - SF1*

Anatomie du crâne et des méninges

- 9) QCM. à propos du crâne foetal
- les os frontaux sont séparés par une suture
 - la mandibule est globalement horizontale
 - l'os occipital est composé de plusieurs parties
 - l'os temporal est le plus volumineux
 - la fontanelle lambda est située entre les os frontaux et pariétaux
- 10) QCM. à propos des méninges
- les espaces sous-arachnoïdiens sont occupés par le liquide cérébro-spinal
 - la ponction lombaire est indiquée en cas de tumeur cérébrale
 - la ponction lombaire recueille du liquide cérébro-spinal
 - la paroi latérale du sinus caverneux est constituée de dure-mère encéphalique
 - le sinus caverneux contient du sang veineux
- 11) QCM. à propos des méninges
- on compte 4 types de méninges
 - la pie-mère enveloppe la moelle épinière
 - la pie-mère est adhérente au feuillet externe de l'arachnoïde
 - la dure-mère est fibreuse
 - les trabéculations de l'arachnoïde sont résistantes

Anatomie du pelvis

- 12) QCM. à propos du pelvis
- les diamètres du détroit supérieur jouent un rôle en obstétrique
 - les cuisses fléchies sur le bassin entraînent une nutation
 - la nutation favorise le dégagement de la tête foetale
 - le muscle obturateur interne entre dans la constitution des parois du pelvis
 - le muscle piriforme entre dans la constitution des parois du pelvis

- 13)** QCM. à propos du pelvis
- a) le septum recto-vaginal se termine sur le centre tendineux du périnée
 - b) la palpation du cul-de-sac recto vaginal est possible par le toucher rectal
 - c) l'uretère croise l'artère utérine
 - d) latéralement à l'utérus, l'artère utérine chemine dans le paramètre
 - e) le myomètre se contracte après la délivrance
- 14)** QCM. à propos du pelvis
- a) à 3 mois de grossesse, le fond utérin est à hauteur de l'ombilic
 - b) l'artère utérine peut participer à la vascularisation de l'ovaire
 - c) l'innervation de l'utérus est végétative
 - d) chez la nullipare l'hymen est toujours intact
 - e) le hile de l'ovaire est sous-péritonéal
- 15)** QCM. à propos du pelvis
- a) le hile de l'ovaire est limité par du péritoine
 - b) il existe un péristaltisme tubaire
 - c) le muscle transverse superficiel du périnée rejoint le centre tendineux du périnée
 - d) le sphincter strié de l'anus est constitué de trois couches
 - e) le muscle élévateur de l'anus appartient au périnée
- 16)** QCM. à propos du pelvis
- a) la ligature des deux artères utérines peut parfois entraîner une ménopause
 - b) les lymphatiques de l'ovaire rejoignent les nœuds lymphatiques lombaires
 - c) le système sympathique est utéro-relaxant
 - d) le tube utérin est sous-péritonéal
 - e) le corps de l'utérus est sous-péritonéal
- 17)** QCM. à propos du pelvis
- a) un antécédent de salpingite peut être la cause d'une grossesse extra-utérine
 - b) l'ostium tubaire s'ouvre dans la cavité péritonéale
 - c) la nidation normale a lieu dans le pavillon tubaire
 - d) le périnée antérieur s'inscrit dans un triangle
 - e) le sphincter strié de l'anus est innervé par le plexus hypogastrique inférieur
- 18)** QCM. à propos du pelvis
- a) chez la nullipare, l'ovaire est pré-urétéral
 - b) chez la multipare, l'orifice du col utérin est irrégulier
 - c) le périnée postérieur possède deux fascias
 - d) l'érection du clitoris est assurée par le nerf pudendal
 - e) le muscle élévateur de l'anus participe au maintien des organes pelviens
- 19)** QCM. à propos du pelvis
- a) le faisceau pubien du muscle élévateur de l'anus se termine en pré-rectal et en rétro-rectal
 - b) le calibre des artères utérines augmente durant la grossesse
 - c) le trajet latéro-utérin des artères utérines est sinueux
 - d) le corps caverneux est érectile
 - e) le nerf du muscle élévateur de l'anus provient du plexus pudendal

Maïeutique

- 20)** QCM. à propos du triple test ou tri-test
- a) il est remboursé par la sécurité sociale
 - b) il est systématiquement proposé aux femmes enceintes
 - c) il repose uniquement sur l'âge maternel
 - d) il est réalisé à n'importe quel terme de la grossesse
 - e) ses résultats s'expriment par un calcul de risque
- 21)** QCM. L'entretien prénatal précoce
- a) s'adresse uniquement à la femme enceinte
 - b) est obligatoire
 - c) est réalisé, de préférence, au cours du 7ème mois de grossesse
 - d) est toujours réalisé par un médecin
 - e) permet d'apprécier la santé globale de la femme enceinte

Gynécologie

- 22)** QCM. à propos de la puberté
- a) la puberté ovarienne débute avec l'apparition des premiers poils pubiens
 - b) la puberté précoce est le plus souvent d'origine centrale
 - c) l'âge osseux est déterminé sur une radiographie du poignet droit
 - d) la puberté s'étend sur plusieurs mois
 - e) les cycles menstruels sont anovulatoires pendant 24 mois suivant la puberté
- 23)** QCS. à propos du cycle menstruel
- a) la sécrétion continue de la GnRH permet la sécrétion de FSH et LH
 - b) les ménorragies sont des règles abondantes
 - c) l'ovaire a une fonction exocrine pure
 - d) au moment de l'ovulation, la température corporelle diminue
 - e) sous l'effet du pic de LH, le follicule pré-antral libère l'ovocyte mature

Obstétrique

- 24)** QCM. à propos de la grossesse
- a) le dosage des β -hCG plasmatiques est indispensable à son diagnostic
 - b) la glaire cervicale est fluide et abondante
 - c) la datation de son début repose sur la mesure du diamètre de l'oeuf
 - d) il existe une hyperpigmentation des aréoles mammaires
 - e) les nausées et vomissements disparaissent souvent lors du deuxième trimestre
- 25)** QCS. Au 1er trimestre, quel est le paramètre le plus fiable pour la datation de la grossesse ?
- a) la date de la ponction ovocytaire lors d'une fécondation in vitro
 - b) la date des dernières règles
 - c) la mesure du périmètre céphalique fœtal échographique
 - d) le taux de β -hCG plasmatique
 - e) la date d'un rapport fécondant unique