

PASS/LAS

Mardi 7 Mai 2024

Module 5	EPREUVE Maïeutique	Durée 45 min
----------	-----------------------	-----------------

CONSIGNES A LIRE AVANT L'EPREUVE

Vérifiez que votre sujet est complet

L'épreuve comporte :

- 1 cahier questions (7 pages)
- 1 feuille de brouillon

IMPORTANT :

Remplissage de la feuille réponses :
lire consignes et exemple de marquage sur la feuille réponses QCM

QCS : une seule réponse exacte

QCM : plusieurs réponses exactes

Conformément aux dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992, tout étudiant auteur ou complice d'une fraude ou d'une tentative de fraude à l'occasion d'un examen ou concours relève du régime disciplinaire prévu par ledit décret. A ce titre, tout fautif est susceptible d'être traduit devant la Section Disciplinaire du Conseil d'Administration de l'Université, et de se voir appliquer une sanction (avertissement, blâme ou exclusion).

1) QCM. Les éléments suivants sont constitutifs de la plaque basale :

- a) Le cytotrophoblaste.
- b) L'amnios.
- c) La caduque basilaire.
- d) La caduque pariétale.
- e) Le mésoderme extra-embryonnaire.

2) QCS. A propos des artères ombilicales :

- a) Elles drainent la vésicule ombilicale.
- b) Elles apparaissent au cours de la troisième semaine de développement.
- c) L'artère ombilicale droite disparaît au cours de la grossesse.
- d) Elles sont connectées à la plaque basale du placenta.
- e) Elles contiennent un sang enrichi en oxygène.

3) QCS. Les acides aminés traversent la membrane placentaire par :

- a) diffusion simple.
- b) transport facilité.
- c) transport actif.
- d) diffusion passive.
- e) endocytose.

4) QCM. Le cordon ombilical primitif est constitué :

- a) de l'amnios.
- b) du canal vitellin.
- c) de la veine ombilicale gauche.
- d) de la veine ombilicale droite.
- e) de l'allantoïde.

5) QCM. A propos d'une grossesse gémellaire monozygotique monochoriale monoamniotique :

- a) Elle est issue du dédoublement du disque embryonnaire didermique.
- b) Cette situation survient après formation de la cavité amniotique.
- c) Elle peut se compliquer d'un syndrome "transfuseur-transfusé".
- d) Les deux enfants seront forcément de sexes différents.
- e) C'est la situation la plus rare parmi les grossesses gémellaires monozygotiques.

6) QCM. A propos des organes génitaux externes indifférenciés :

- a) Ils se développent autour de la membrane cloacale.
- b) Ils mettent en jeu la prolifération de tissu endodermique.
- c) Ils commencent à se former à partir de la quatrième semaine de développement.
- d) L'éminence cloacale est issue du tubercule génital.
- e) Les bourrelets génitaux sont issus des replis cloacaux.

7) QCS. Chez un embryon de sexe masculin, les tubules mésonéphrotiques vont se différencier :

- a) en canaux éjaculateurs.
- b) en vésicules séminales.
- c) en rete testis.
- d) en canaux efférents.
- e) en aucune des structures énumérées ci dessus.

8) QCS. Chez un embryon de sexe féminin, lequel de ces gènes est inhibé par *WNT-4* ?

- a) *SOX-8*
- b) *SOX-9*
- c) *SOX-10*
- d) *SRY*
- e) Aucun des gènes énumérés ci-dessus

9) QCS. Quelle fontanelle est la dernière à se fermer ?

- a) Aucune, elles se ferment simultanément.
- b) Le bregma
- c) Le lambda
- d) L'astérisque
- e) La ptérioriale

10) QCM. A propos des méninges rachidiennes :

- a) Lors d'une anesthésie péridurale, il est important de retirer du liquide cébrospinal.
- b) L'espace épidural est virtuel.
- c) L'espace sous-arachnoïdien est réel.
- d) La ponction lombaire se fait préférentiellement dans la région lombaire basse.
- e) La ponction lombaire est un examen de choix en cas de suspicion de tumeur de la fosse postérieure.

11) QCM. A propos de la dure-mère du crâne :

- a) La faux du cerveau est formée de dure-mère interne (encéphalique).
- b) La tente du cervelet est formée de dure-mère externe (ostéo-périostée).
- c) Le sinus latéral est bordé de dure-mère externe (ostéo-périostée).
- d) Le sinus latéral est bordé de dure-mère interne (encéphalique).
- e) Le diaphragme sellaire est formé de dure-mère interne (encéphalique).

12) QCM. A propos du dépistage du cancer du col de l'utérus :

- a) Il doit être réalisé dès les premiers rapports sexuels quel que soit l'âge.
- b) Il consiste en la réalisation d'un frottis cervico-utérin pour examen cytologique ou un test HPV-HR (Human Papilloma Virus-Haut Risque).
- c) En l'absence d'anomalie en dépistage primaire, il est recommandé de pratiquer un test de dépistage tous les trois ans jusqu'à soixante-cinq ans.
- d) Il est réalisé à différentes fréquences selon la tranche d'âge de la patiente.
- e) Il s'inscrit dans le cadre d'un programme national organisé.

13) QCM. A propos de l'allaitement maternel :

- a) Il augmente le risque de développer des caries chez l'enfant.
- b) Il est recommandé de manière exclusive durant quatre à six mois, puis au-delà en complément de la diversification.
- c) Son indice carbone est quasi nul par rapport à l'utilisation de lait artificiel.
- d) Il diminue le risque de gastro-entérites, d'infections ORL et respiratoires chez la mère.
- e) Il est recommandé dans tous les cas.

14) QCM. A propos de l'anatomie du pelvis :

- a) Le muscle obturateur interne appartient à la paroi latérale du pelvis.
- b) Il existe un plancher périnéal antérieur et postérieur.
- c) Le faisceau pubo-prérectal du muscle élévateur de l'anus s'insère sur le centre tendineux du périnée.
- d) L'arc tendineux du muscle élévateur de l'anus est une condensation du fascia du muscle obturateur interne.
- e) Le faisceau ischio-rétrorectal du muscle élévateur de l'anus s'insère sur l'arc tendineux de ce muscle.

15) QCM. A propos de l'anatomie du pelvis :

- a) La nutation favorise le dégagement de la tête fœtale.
- b) La contre-nutation est favorisée par la position membres inférieurs pendants au bord de la table d'accouchement.
- c) Une partie du muscle obturateur interne est extra-pelvienne.
- d) Le muscle ischio-coccygien n'appartient pas à proprement parler au muscle élévateur de l'anus.
- e) Des fibres du muscle élévateur de l'anus sont sous-cutanées.

16) QCM. A propos de l'anatomie du pelvis :

- a) L'artère ombilicale est uniquement pariétale.
- b) L'artère vaginale est sinueuse.
- c) L'artère pudendale passe latéralement au ligament sacro-épineux.
- d) L'artère pudendale participe à la vascularisation du périnée antérieur et postérieur.
- e) Le segment pré-urétéral de l'artère utérine participe à la vascularisation de la vessie.

17) QCM. A propos de l'anatomie du pelvis :

- a) Le segment pré-urétéral de l'artère utérine participe à la vascularisation du col utérin.
- b) Des veines utérines rejoignent les veines de l'ovaire.
- c) Des lymphatiques du fond utérin se drainent dans les nœuds lymphatiques iliaques externes.
- d) Des lymphatiques du fond utérin se drainent dans les nœuds lymphatiques inguinaux.
- e) Les lymphatiques de l'ovaire se drainent dans des nœuds lymphatiques en situation lombaire.

18) QCM. A propos de l'anatomie du pelvis :

- a) Les médicaments sympathomimétiques sont utéro-relaxants.
- b) L'innervation du myomètre est uniquement végétative.
- c) Le cap anorectal est maintenu par le muscle élévateur de l'anus.
- d) L'axe du vagin est dirigé en haut et en arrière.
- e) En dehors de la grossesse, la face dite antérieure du corps utérin est située au-dessus de la face supérieure de la vessie.

19) QCM. A propos de l'anatomie du pelvis :

- a) Le muscle élévateur de l'anus joue un rôle important dans la statique pelvienne.
- b) Le cul-de-sac péritonéal situé en arrière de l'utérus atteint en bas le dôme vaginal.
- c) La lame sacro-pubienne contient le plexus hypogastrique inférieur.
- d) Le tube utérin comporte deux couches musculaires lisses.
- e) L'intérieur du tube utérin est tapissé d'une muqueuse.

20) QCM. A propos de l'anatomie du pelvis :

- a) Le hile de l'ovaire est le lieu d'insertion de trois ligaments.
- b) Le ligament lombo-ovarien est rétro-péritonéal.
- c) L'ostium tubaire s'ouvre dans la cavité péritonéale.
- d) L'artère utérine peut donner une artère ovarique médiale.
- e) Le corps utérin est sous-péritonéal.

21) QCM. A propos de l'anatomie du pelvis :

- a) Dans son trajet pelvien, l'uretère passe latéralement au rectum.
- b) L'uretère croise l'artère utérine en dehors de la jonction cervico-vaginale.
- c) L'ovocyte est pondue par l'ovaire dans la cavité péritonéale.
- d) Une partie de l'ovaire est en situation intra-péritonéale.
- e) Le ligament rond soulève un repli du ligament large.

22) QCM. Quelles sont les affirmations exactes ?

- a) La période pubertaire dure quatre ans en moyenne.
- b) La puberté surrénalienne peut être simultanée de la puberté ovarienne.
- c) Selon l'âge osseux, l'os sésamoïde du pouce apparaît à onze ans.
- d) La vaccination HPV, appelée Gardasil 9, peut être pratiquée jusqu'à l'âge de vingt six ans chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.
- e) Entre onze et quatorze ans, la vaccination anti-HPV se fait avec deux doses espacées de six mois.

23) QCM. Quelles sont les affirmations exactes ?

- a) Entre vingt-cinq et vingt-neuf ans, le dépistage du cancer du col de l'utérus se fait par un prélèvement cytologique.
- b) Lors de la péri-ménopause, le nombre de follicules ovariens diminue, en conséquence la FSH baisse.
- c) En situation physiologique, le diagnostic de la ménopause se fait par une prise de sang.
- d) Le traitement hormonal de la ménopause est indiqué en cas de syndrome climatérique invalidant.
- e) Chez les patientes ayant eu une hystérectomie, le traitement hormonal de la ménopause contient uniquement de l'œstradiol.

24) QCS. A propos de la grossesse, quelle est l'affirmation exacte ?

- a) Le dosage des Béta-HCG plasmatiques est indispensable au diagnostic de la grossesse.
- b) La glaire cervicale est fluide et abondante lors de l'examen au spéculum.
- c) La datation du début de grossesse repose sur la mesure du diamètre bi-pariétal fœtal.
- d) Il existe une hyper-pigmentation des aréoles mammaires.
- e) Les nausées et vomissements apparaissent au second trimestre.

25) QCM. A propos de la natalité en France, quelles sont les affirmations exactes ?

- a) Le nombre de naissances en France est en constante augmentation depuis 10 ans.
- b) La natalité dépend du nombre de femmes en âge de procréer.
- c) L'indicateur conjoncturel de fécondité en France est l'un des plus élevés d'Europe.
- d) Le taux de fécondité des françaises est plus élevé à vingt ans qu'à trente ans.
- e) Le solde naturel d'une population est la différence entre le nombre de naissances et celui des décès.